

GUÍA DE CAMPO

PLANTAS NATIVAS
DE LA SIERRA DE
COMECHINGONES



El Pantanillo
Jardín Botánico

AUTOR/AS

Cecilia Genovese
Melina Costa
Alejandro Suyama

[**Ver más sobre el/las autor/as**](#)

[**Sobre esta guía**](#)

COLABORADORES

Soledad Seguy
Carla Toledo
Micaela Nogue
Mariano Reschia

DISEÑO

María Fernanda Corzo

DISEÑO UI

Mario Schvening

AGRADECIMIENTO

Esta Guía de campo fue posible gracias al financiamiento de la Secretaría de Extensión de la UNSL en el marco de los Proyectos de Extensión de Interés Social, PEIS 2019 (Proyecto N° 11-0319) y a la colaboración de los socios del Club Andino San Luis.

Agradecemos a Aníbal Prina y Germán Roitman la lectura y sugerencias sobre el manuscrito y a Carina Rives y Ariana Posadaz por algunas de las fotografías que ilustran este trabajo.

ENLACE PARA EL FORMULARIO DE OPINIÓN Y SUGERENCIAS

[HTTP://BIT.LY/OPINIONESGUIA](http://bit.ly/opinionesguia)

Encontranos en redes sociales

 [WWW.INSTAGRAM.COM/JB_ELPANTANILLO](http://www.instagram.com/jb_elpannillo)

 [WWW.FACEBOOK.COM/JB.ELPANTANILLO](http://www.facebook.com/jb.elpannillo)

 guiadecampoftu@gmail.com

Genovese, María Cecilia

Guía de campo: plantas nativas de la Sierra de Comechingones / María Cecilia Genovese ; Melina Andrea Costa ; Alejandro Daniel Suyama; Diseño: María Fernanda Corzo. - 1a ed ilustrada. - San Luis: Universidad Nacional de San Luis, 2023.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-950-609-095-1



9 78950 6090951



CONTENIDO



ÁRBOLES

[ALGARROBO BLANCO O CHILENO](#)

[ALGARROBO NEGRO](#)

[CHAÑAR](#)

[COCO](#)

[DURAZNITO DE LA SIERRA](#)

[ESPINILLO](#)

[ESPINILLO NEGRO](#)

[MANZANO DEL CAMPO](#)

[MOLLE DE BEBER](#)

[MORADILLO](#)

[PEJE](#)


[QUEBRACHO BLANCO](#)

[TABAQUILLO](#)

[TALA](#)

[TALA FALSO](#)

[TINTITACO](#)



ARBUSTOS

[ALBARICOQUE](#)

[MALVAVISCO GRANDE](#)

[ALFALFILLA](#)

[PALO ANGEL](#)

[ATAMISQUI](#)

[PEPERINA](#)

[BARBA DE CHIVO](#)

[PIQUILLÍN](#)

[CAÑUTO](#)

[PIQUILLÍN DE LA VÍBORA](#)

[CARQUEJILLA](#)

[POLEO](#)

[CHILCA](#)

[PRIMAVERA](#)

[CHILQUILLA / BAILABIEN](#)

[QUIEBRARADO](#)

[COLALECHE](#)

[ROMERILLO](#)

[CROTÓN](#)

[SALVIA AZUL](#)

[CUCHARERO](#)

[SALVIA BLANCA](#)

[DURAZNILLO NEGRO](#)

[SALVIA SERRANA](#)

[ESPINA AMARILLA](#)

[SALVIALORA](#)

[JARILLA](#)

[TOLA TOLA](#)

[JAZMÍN DE CÓRDOBA](#)

[TRAMONTANA](#)



CONTENIDO



HERBÁCEAS

[BORRAJA DEL CAMPO](#)

[CAMAMBÚ](#)

[CARDO AMARILLO](#)

[CHAGUAR](#)

[CHILCA MELOSA](#)

[CHINITA DEL CAMPO](#)

[CHUSCHO DE MONTE](#)

[CLEOME](#)

[COIRÓN](#)

[COLA DE QUIRQUINCHO](#)

[CORAL DEL CAMPO](#)

[CORTADERA](#)

[CULANDRILLO](#)

[DORADILLA](#)

[FLOR DE LA ORACIÓN](#)

[FLOR DE LA VIDA](#)

[HELECHO DE LA SIERRA](#)

[HIERBA DE LA VÍBORA](#)

[HUEVITO DE GALLO](#)

[KITUCHO](#)

[LIGA BLANCA](#)

[LIGA ROJA](#)

[MARCELA](#)

[MASTUERZO](#)

[ORQUÍDEA BLANCA](#)

[ORQUÍDEA ROJA](#)

[ORQUÍDEA VERDE](#)

[PALO DE LECHE](#)

[PETUNIA](#)

[REDONDITA DEL AGUA](#)

[ROMERILLO BLANCO](#)

[SANGRE DE TORO](#)

[SANGUINARIA](#)

[SANTA LUCÍA](#)

[SIEMPREVIVA](#)

[STEVIA](#)

[SUICO](#)

[TOPASAIRE](#)

[VARA DE ORO](#)

[VERBENA ROJA](#)



CONTENIDO



TREPADORAS

BROTAL

CABELLO DE ANGEL

CAMPANILLA / SUSPIRO

CAMPANILLA ROJA

CAMPANILLA ROSA

FLOR DE PATITO

GLOBITO

JAZMÍN CHILENO

MANDEVILLA

MARIPOSA

PASIONARIA

PEINE DE MONO

SOMBRILLA / FILIBERTIA

TASI

INFOGRAFÍAS

Familia / Especie / Nombre

Usos



ALIMENTICIO



MEDICINAL




TINTÓREO



ORNAMENTAL



CEREMONIAL



AROMÁTICA

FRECUENCIA DE OBSERVACIÓN



BAJA




MEDIA



ALTA

Escala de altura promedio

m



Barra de floración y fructificación

flor

fruto

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**



ÁRBOLES



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Algarrobo Blanco o Chileno



Familia

Fabaceae

Frecuencia




Especie

Neltuma chilensis

Otros nombres

Tacku, Tamarugo

Usos



Sus frutos (chauchas) son achatadas y de tonalidades claras. Es frecuente en los ambientes serranos hasta los 1000 m s.n.m., siendo difícil encontrarlo por arriba de esa cota. Es fácil confundirlo con otro Algarrobo también denominado Blanco (***Neltuma alba***) más frecuente en las planicies sin laderas prominentes y con hojas más pequeñas.

Altura promedio: **12 m**



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico

 **FTU**
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Algarrobo Negro



Familia

Fabaceae

Frecuencia



Especie

Neltuma nigra

Otros Nombres


Algarrobo chico

Usos



Generalmente de menor porte que ***Neltuma chilensis***, presenta hojas más pequeñas que las de los otros algarrobos. El fruto es una legumbre (chaucha) de tonalidad oscura con estrangulamientos entre las semillas.

Altura promedio: **6 m**



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Caranday



Familia

Arecaceae

Frecuencia




Especie

Trithrinax campestris

Otros nombres


Palma

Usos



Es una palmera caracterizada por presentar una "pollera" generada por los restos de las hojas viejas que cubren los tallos o estípites. Puede presentar hasta tres estípites cada ejemplar. Los palmares de Caranday se encuentran en sitios específicos con gran número de ejemplares, fuera de esas áreas es muy difícil hallarlas.

Altura promedio: **4 m**



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico

 **FTU**
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Chañar



Familia

Fabaceae

Frecuencia




Especie

Geoffroea decorticans

Otros nombres

Chañar brea

Usos



Su característica más llamativa es que la corteza vieja se descasca-
ra dejando ver la nueva de un co-
lor verde claro y brillante. En los
ejemplares mas añejos esa cor-
teza deja de desprenderse y toma
una coloración grisácea. Su fruto
es una drupa muy buscada por su
uso alimenticio y medicinal.

Altura
promedio: **4 m**



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Coco



Especie

Zanthoxyl




11. *What is the primary purpose of the following statement?*



Otros nom

Sauco hediondo

Usos



de Molle de beber. Tiene agujones en el tronco y sus hojas emanan un olor fuerte al estrujarlas. Las hojas también presentan agujones.

promedio: **7 m**



www.[tor.com](http://www.tor.com)

fruto

flor


[VOLVER AL ÍNDICE](#)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU

Facultad de Turismo y

GUÍA DE CAMPO NATIVAS




Duraznito de la Sierra



Familia

Rosaceae

Frecuencia





Especie

Kageneckia lanceolata

Otros nombres Sacha durazno

Usos



Arbusto grande o árbol pequeño habitualmente cercano al mollar. Sus ramas no presentan espinas. Sus hojas recuerdan a las del árbol de durazno. El fruto leñoso, de forma estrellada, permanece en la planta mucho tiempo.

Altura promedio: **4 m**



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Espinillo



Familia

Fabaceae

Frecuencia




Especie

Vachellia caven

Otros nombres


Aromito, Churqui

Usos



Una de sus principales características es la presencia de espinas blancas o grises, cónicas, de hasta 3 cm de longitud, dispuestas de a pares formando una V. Al inicio de la primavera su floración es muy notable, por coloración y aroma.

Altura promedio: **4 m**



flor

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

fruto



El Pantanillo
Jardín Botánico





FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**



Espinillo Negro



Familia

Fabaceae

Frecuencia




Especie

Vachellia astringens

Otros nombres

Aromito negro

Usos



Suele confundirse con ***Vachellia caven*** (Espinillo), pero sus ramas son más oscuras, las espinas más cortas, sus inflorescencias presentan un pedúnculo (tallito) más largo y sus frutos son más alargados y de color negro.

Altura promedio: **5 m**



flor

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Manzano del Campo



A collage of three images illustrating the Polygonaceae family. The left image shows a dense, green, leafy shrub. The middle image is a close-up of a yellow flower with a dark center. The right image shows a small, green, triangular seedling with a single visible leaf.

Especie *Ruprechtia ape*



Otros nombres **Sacha manzano**

Arbolito dioico (presenta ejemplares masculinos y ejemplares femeninos), característico por el tamaño de sus hojas de hasta 12 cm, con el borde ondulado. Los ejemplares femeninos presentan inflorescencias rojizas muy llamativas. En otoño su follaje se torna rojizo.

promedio: **5 m**



C FN

March

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Page 1 of 1



El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y

GUIA DE CAMPO NATIVAS



Molle de Beber



Parma

Anacardiaceae

Freudenberg

Espresso

Ernesto Molina

A horizontal row of five decorative icons. From left to right: a fork, a plate, a glass, a leaf, and a bowl. These icons are used to represent various food and drink items.

1000 m s.n.m., característico por su copa globosa. Sus hojas perennes de un verde oscuro brillante, presentan nervaduras secundarias paralelas muy notables. Sus frutos son blanquecino-verdosos de sabor dulce.

promedio: **6 m**

JECT NO.

ENE

[**VOLVER AL ÍNDICE**](#)

BRUNSWICK COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION



El Pantanillo

Jardín Botánico




FIU Facultad de Turismo y Urbanismo

GUIA DE CAMPO **NATIVAS**



Moradillo



Especie





Schinus fasciculatus

11. *What is the primary purpose of the following statement?*

Otros nom

Molle pispo

Usos



con follaje perenne. Sus hojas son de color verde oscuro, brillantes, y pueden tener diferentes formas. Sus tallos mas jóvenes son de color castaño morado.

promedio: **6 m**



flor
201

fruto

NOVEMBER AL ÁRIDO

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo




FTU

Facultad de Turismo y Urbanismo

GUIA DE CAMPO **NATIVAS**




Peje



Familia

Cervantesiaceae

Frecuencia




Especie

Jodina rhombifolia

Otros nombres


Sombra de toro

Usos



Su característica más llamativa es la forma y textura de sus hojas: romboidales, coriáceas y con una espina en cada vértice. Es de las pocas especies que florece en invierno y sus flores tienen un olor dulce muy característico. Es hemiparásito de raíces de Tala, es común hallar ambas especies compartiendo ambientes.

Altura promedio: **4 m**



flor

fruto

flor

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Quebracho Blanco




Familia **Apocynaceae** Frecuencia

Especie ***Aspidosperma quebracho-blanco***

Otros nombres Quebracho llorón Usos

Sus características más llamativas son: la textura gruesa de su corteza, con profundos surcos que forman rectángulos y las hojas de consistencia rígida con una espina en el ápice. Su fruto es una cápsula rígida que al abrirse libera semillas aladas.

Altura promedio: **15 m**



fruto

flor

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Tabaquillo



Familia

Rosaceae


Frecuencia



Especie

Polylepis australis

Otros nombres Queñoa, Tabaco del monte Usos



Su rasgo más llamativo es la corteza de color castaño claro, compuesta por láminas muy finas superpuestas.

En las sierras ocupa ambientes de quebradas húmedas por arriba de los 1200m, llegando a formar bosques casi exclusivos de la especie.

Altura promedio: **4 m**



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico





FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**

ÁRBOLES



Tala



Parma


Cannabaceae

Celtis tala

Freudiana

Otros nom

Tala árbol



espinas cónicas, robustas, solitarias o dispuestas de a pares en los nudos. Sus ramas jóvenes crecen en zig-zag. Sus frutos anaranjados y dulces son muy

promedio: **5 m**



dos p

truto



El Pantanillo




DICE
FTU
Facultad de
Tecnología

GUÍA DE CAMPO



Tala Falso



Parma

Bougainvillea s.

Freudiana




Espécie

Alfilerillo


11. **What is the primary purpose of the *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*?**

111



corteza rugosa con finos surcos que forman placas poligonales y sus espinas rectas, muy finas, que recuerdan a alfileres en las axilas de las hojas y ramas jóvenes. Su nombre vulgar hace referencia a su similitud con el Tala (***Celtis tala***) pero sus hojas presentan borde

Altura
promedio: **5 m**



118 / 119

ABB M

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

VOLVER AL ÍNDICE



El Pantanillo



FTU
Facultad de
Turismo y

GUÍA DE CAMPO MATEMÁTICAS




Tintitaco



Familia

Fabaceae

Frecuencia




Especie

Strombocarpa torquata

Otros nombres

Espinillo negro

Usos



Presenta hojas compuestas, más pequeñas que otros Algarrobos (grupo al que pertenece). Sus flores se distinguen por su color amarillo. El fruto es una chaucha carnosa, con estrangulamientos entre semillas, violácea y enroscada. Su madera es extremadamente dura.

Altura promedio: **5 m**



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico

 **FTU**
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



ARBUSTOS



El Pantanillo

Jardín Botánico




FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**




Albaricoque



Familia

Olacaceae

Frecuencia




Especie

Ximenia americana

Otros nombres Damasquito serrano

Usos



comestible

Arbusto grande, a veces arbolito, con tronco corto, hojas caducas de color verde grisáceas con borde liso y plegadas sobre la nervadura central. Su fruto parece un damasco.

Altura promedio: **2 m**



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Alfalfilla



Familia

Acanthaceae

Frecuencia



Especie

Justicia tweediana

Otros nombres

Boca de conejo

Usos



forrajera / ornamental

Ramas y hojas de color verde claro. Flores de color violáceo con un ancho labio inferior con estriadas blancas.

Altura promedio: **1 m**



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico




FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Atamisqui



Familia

Capparaceae

Frecuencia





Especie

Atamisquea emarginata

Otros nombres

Matagusanos

Usos



tintórea / medicinal / ornamental

Hojas linear-oblanceoladas de color verde oscuro en el haz y grisáceo en el envés. Flores blancas muy pequeñas, frutos pequeños pubescentes.

Altura promedio: **3 m**



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**



Barba de Chivo



Familia

Fabaceae

Frecuencia




Especie

Erythrostemon gilliesii

Otros nombres Lagaña de perro

Usos



tintórea / ornamental / repelente

Hojas compuestas color verde glauco, no tiene espinas. Flores amarillas con largos estambres rojos.

Su fruto es una legumbre aplanada que luego de liberar las semillas se enrolla de forma vistosa.

Altura promedio:



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Cañuto



Familia

Escalloniaceae

Frecuencia




Especie

Escallonia cordobensis

Otros nombres

Pito

Usos




ornamental

Crece en márgenes de cursos de agua. Hojas con borde suavemente dentado, flores blancas muy vistosas.

Altura promedio:

2 m



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**




Carquejilla



Familia

Asteraceae

Frecuencia





Especie

Baccharis articulata

Otros nombres

Carqueja


Usos



medicinal / ornamental

Planta sin hojas. Tallos verdes con alas longitudinales. Flores blancas o castañas, pequeñas, agrupadas en capítulos muy abundantes, con suave perfume. Típicamente dos alas a los costados de tallo. Cuando es pequeña presenta tres alas, pero en esta etapa no florece.

Altura promedio: **1 m**



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Chilca



Familia

Asteraceae

Frecuencia





Especie

Austroflourensia thurifera

Otros nombres Maravilla del campo


Usos



medicinal / ornamental

Hojas grandes, brillantes, con borde dentado, resinosas y algo aromáticas. No tiene espinas. Forma poblaciones conocidas como "chilcales".

Altura promedio: **2 m**



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Chilquilla / Bailabien



Familia

Asteraceae

Frecuencia




Especie

Baccharis flabellata

Otros nombres

Pata de pato


Usos



Ornamental/medicinal

Arbusto mediano a pequeño. Hojas pequeñas, perennes, verde brillantes, angostas en la base formando un pseudo pecíolo, más anchas hacia el ápice con dientes marcados. Flores pocos vistosas. Si bien en la zona se la reconoce por "Bailabien" no se trata de la especie utilizada como afrodisíaco (*Haplopappus baylahuen*).

Altura promedio:



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**




Colaleche



Familia

Asteraceae

Frecuencia




Especie

Vernonanthura nudiflora

Otros nombres Alecrim del campo

Usos




ornamental

Subarbusto perenne. Crece en suelos pedregosos. Hojas lineares (largas y angostas), inflorescencias de color púrpura, frutos con papus blanco. Durante el invierno pierde todas las hojas.

Altura promedio:

1 m



flor

fruto

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico




FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Crotón



Familia

Euphorbiaceae

Frecuencia





Especie

Croton lachnostachyus

Otros nombres

Botonillo

Usos



medicinal / ornamental

Hojas grandes, afelpadas, más claras en el envés, se tornan anaranjadas en otoño. Crece asociada al Molle de beber.

Altura promedio:



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico




FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Cucharero



Familia

Zygophyllaceae

Frecuencia






Especie

Porlieria microphylla

Otros nombres

Guayacán


Usos



medicinal / ornamental / tintórea

Hojas compuestas pequeñas, su follaje presenta textura delicada y ramas intrincadas. El fruto pequeño se divide en cuatro globulos casi aplanados. Se lo suele encontrar en el estrato arbustivo del bosque serrano.

Altura promedio:



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)




El Pantanillo
Jardín Botánico

 **FTU**
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Duraznillo Negro



Familia **Solanaceae**

Frecuencia

Especie ***Cestrum parqui***


Otros nombres Palque, Hediondilla

Usos

medicinal / ornamental

Hojas verde oscuro con olor desagradable al tocarlas. Tóxica para el ganado. Flores amarillas en inflorescencias densas muy llamativas en primavera.

Altura promedio:



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Espina Amarilla



Familia

Berberidaceae

Frecuencia







Especie

Berberis ruscifolia

Otros nombres Quebrachillo, Calafatillo


Usos



comestible / tintorea / medicinal / ornamental

Hojas coriáceas, con puntas espinosas. Tallos con espinas trifidas. Suele estar cerca de cursos de agua. Flores amarillas muy llamativas en el breve periodo de floración. Frutos globosos color azulado a negruzco.

Altura promedio:



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS

ARBUSTOS



Jarilla



Parma

Zygophyllaceae

Larrea divaricata

Freudiana

Espresso


Carica carica

11. *What is the primary purpose of the following statement?*

medicinal / ornamental /

Hojas brillantes, algo rígidas y resinosas, hendidas casi hasta la base formando una "v". Fruto piloso (con pelos). Si bien existen poblaciones en algunos sectores del faldeo serrano, es mucho más frecuente hacia la zona del valle.

Altura promedio:



flor fruto

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico




FTU
Facultad de
Turismo y

GUÍA DE CAMPO NATIVAS



Jazmín de Córdoba



Familia **Solanaceae**

Frecuencia

Especie ***Solanum angustifidum***


Usos

Otros nombres Jazmín del cielo

ornamental

Arbusto de aspecto laxo con ramas largas y flexibles. Crece cerca de cursos de agua, generalmente a la sombra. Sus flores son muy llamativas.

Altura promedio:



flor fruto

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico

 **FTU**
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Malvavisco Grande



Familia

Malvaceae

Frecuencia



Especie

Abutilon grandifolium

Otros nombres Malva del monte


Usos



ornamental

Ramas jóvenes pilosas, hojas grandes (15 cm aprox) con forma de corazón, suaves al tacto, con largos pecíolos. Su floración se prolonga hasta las primeras heladas.

Altura promedio:



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Palo Ángel



Familia

Verbenaceae

Frecuencia





Especie

Lantana grisebachii

Otros nombres

Lantana


Usos



medicinal / ornamental

Crece en zonas sombrías o semisombrías. Sus hojas tienen un olor fuerte al frotarlas. Los frutos son carnosos (drupas) de color blanco.

Altura promedio:



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico




FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**



Peperina



Familia **Lamiaceae** Frecuencia

Especie ***Minthostachys verticillata***


Otros nombres Peperina cordobesa

Usos medicinal / ornamental

Subarbusto perenne, muy ramoso y sumamente aromático, con tallo cuadrangular, hojas aovadas verde claro y flores muy pequeñas de color blanco.

Altura promedio:

1 m



flor fruto

[VOLVER AL ÍNDICE](#)




Piquillín



Familia

Rhamnaceae

Frecuencia




Especie

Condalia microphylla

Otros nombres Piquillín chico


Usos



comestible / tintorea / medicinal / ornamental

Ramas terminadas en punta. Hojas simples, enteras muy pequeñas. Flores amarillentas muy pequeñas pero muy abundantes. Fruto rojo llamativo y dulce. Puede llegar a confundirselo con el Moradillo, pero sus hojas no varían en tamaño. Existe además un híbrido **Condalia x montana** de hojas más grandes.

Altura promedio:



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Piquillín de la Víbora



Familia **Solanaceae**

Frecuencia

Especie ***Lycium ciliatum***


Otros nombres **Tumiñico**

Usos

medicinal / ornamental

Tallos péndulos, a veces apoyantes. Suele crecer a la sombra, debajo de árboles, entremezclado con otros arbustos o enredaderas. Puede llegar a confundirselo con el Usillo, pero no es aromático y en época de fructificación su frutos son muy llamativos.

Altura promedio:



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico




FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**




Poleo



Familia

Verbenaceae

Frecuencia







Especie

Lippia turbinata

Otros nombres Té del país


Usos



aromática / medicinal / tintórea / ornamental

Tallos grises, cuadrangulares. Hojas muy aromáticas. En invierno pierde el follaje pero permanecen los restos de los frutos secos adheridos al tallo. La inflorescencia es de aspecto redondeado, al igual que el aspecto general de la planta.

Altura promedio:



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU


Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO

NATIVAS




Primavera



Familia

Fabaceae

Frecuencia




Especie

Collaea argentina

Otros nombres Arvejilla de la sierra


Usos



ornamental

Crece en zonas altas, cerca de cursos de agua. Las hojas están divididas en 3 folíolos de color verde oscuro en la cara superior y grisáceo en la inferior. Las chauchas permanecen en la planta buena parte del verano.

Altura promedio:



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Quiebrarado



Familia

Lythraceae

Frecuencia






Especie

Heimia salicifolia

Otros nombres Hierba de la vida


Usos



medicinal / tintórea / ornamental /
melifera

Las flores son muy visitadas por abejas y abejorros. Los pétalos caen fácilmente y el caliz permanece en el tallo por mucho tiempo, aun seco.

Altura promedio:



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Romerillo



Familia

Asteraceae

Frecuencia





Especie

Baccharis aliena

Otros nombres Romerillo de las sierras


Usos



medicinal / ornamental / melifera

Presenta hojas lineares (parecidas al romero). La floración es muy abundante. Forma poblaciones en zonas altas y medias de la sierra a las que se les denomina "romerillales".

Altura promedio:



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Salvia Azul



Familia

Lamiaceae

Frecuencia





Especie

Salvia cuspidata

Otros nombres Salvia morada

Usos




medicinal / ornamental

Arbusto muy ramoso, encontrado habitualmente en la sierra por encima de los 1000 m.s.n.m..

Tiene hojas aromáticas y espigas de flores azules.

Altura promedio:

2 m



flor

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico

FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Salvia Blanca



Familia

Scrophulariaceae

Frecuencia





Especie

Buddleja cordobensis

Otros nombres

Salvialora

Usos



medicinal / ornamental

Tallos y hojas llamativos por su color gris claro. Flores amarillas dispuestas en cabezuelas. Por lo general en zonas de laderas muy expuestas al sol.

Altura promedio:



flor


fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Salvia Serrana



Familia

Lamiaceae

Frecuencia




Especie

Lepechinia floribunda

Otros nombres Salvia blanca

Usos




ornamental

Subarbusto presente en ambientes asociados a Molle de beber (**Lithraea molleoides**), aromático, con flores blancas a veces liláceas, acampanadas. Su caliz de aspecto translúcido a la madurez, queda en el tallo durante todo el invierno. .

Altura promedio:

1 m



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico

FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Salvialora



Familia

Verbenaceae

Frecuencia





Especie

Lippia junelliana

Otros nombres Salvia de la cabra


Usos



medicinal / ornamental

Arbusto muy ramoso, con tallos leñosos. Hojas muy aromáticas. Puede llegar a confundirselo con el Poleo, pero generalmente presenta un aspecto algo mayor y las flores son notablemente coloreadas.

Altura promedio:



flor **fruto**

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Tola Tola



Familia

Rhamnaceae

Frecuencia





Especie

Colletia spinosissima

Otros nombres Barba de tigre, Coronillo


Usos



medicinal / melífera

Arbusto sin hojas visibles, con ramas gruesas y punzantes de color verde. Durante el momento de floración las flores cubren gran parte de las ramas, pudiéndose encontrar ejemplares con flores blancas o rosadas.

Altura promedio:



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Tramontana



Familia **Ephedraceae**

Frecuencia

Especie ***Ephedra triandra***


Otros nombres **Pico de loro**

Usos

medicinal / tintórea / melifera

Arbusto apoyante de amplia distribución. Presenta ramas delgadas y flexibles, con hojas escamosas muy reducidas, casi imperceptibles a simple vista. Existe una especie muy parecida, pero de aspecto más robusto en zonas altas de la sierra (***Ephedra americana***)

Altura promedio:



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Usillo



Familia

Verbenaceae

Frecuencia




Especie

Aloysia gratissima

Otros nombres

Palo amarillo


Usos



medicinal / aromática / melífera

Arbusto aromático muy ramoso, con hojas de tamaños diversos. Florece despues de cada lluvia. Sus flores son muy perfumadas. Las inflorescencias y el aspecto general de la planta son alargados. Esto la distingue del poleo de aspecto redondeado.

Altura promedio:



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



HERBÁCEAS



El Pantanillo
Jardín Botánico

FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Borraja del Campo



Familia

Boraginaceae

Frecuencia





Especie

Heliotropium amplexicaule

Otros nombres Pucará

Usos




medicinal / ornamental

Pequeña mata con flores blancas, celestes o lilas y centro amarillo, dispuestas en inflorescencias con forma de cola de escorpión.

Altura promedio:

40 cm



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Camambú



Familia **Solanaceae**

Frecuencia

Especie ***Physallis viscosa***

Otros nombres **Huevo de gallo, Kaité**


Usos

medicinal / comestible

Hierba perenne con tallos erectos y flores con caliz y corola acampanados. Cuando fructifica, el caliz crece formando una cápsula (cáliz) que envuelve al fruto, una baya amarilla de 1 cm de diámetro, comestible de sabor dulce.

Altura promedio:

30 cm



flor **fruto**

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU

Facultad de

Turismo y

Urbanismo


GUÍA DE

CAMPO

NATIVAS




Cardo Amarillo



Familia

Papaveraceae

Frecuencia





Especie

Argemone subfusiformis

Otros nombres Cardo santo

Usos




medicinal / ornamental

Plantas anuales con hojas, tallo y frutos espinosos. Las hojas tienen las nervaduras blanquecinas. Es frecuente verlas en ambientes modificados.

Altura promedio:

60 cm



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Chaguar



Familia

Bromeliaceae

Frecuencia



Especie

Puya spathacea

Otros nombres Casto

Usos




ornamental

Endémica. Habitual en barrancas y suelos rocosos. Hojas verde grisáceo con agujones. Inflorescencia rojiza. Existe otra especie con hojas y tallos muy parecidos, pero de flores amarillas (*Dyckia floribunda*)

Altura promedio:

80 cm



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**



Chilca Melosa



Familia

Asteraceae

Frecuencia




Especie

Grindelia pulchella var. *discoidea*

Otros nombres Margarita amarilla

Usos




ornamental

Planta endémica. Presenta aspecto de mata con hojas coriáceas (algo rígidas) y márgenes dentados. Flores sin pétalos. Disco central amarillo con textura pegajosa.

Altura promedio:

40 cm



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Chinita del Campo



Familia

Asteraceae

Frecuencia





Especie

Zinnia peruviana

Otros nombres

Flor de papel

Usos




medicinal / ornamental

Hierba anual, flores carmín, anaranjadas y a veces amarillentas. La flor seca permanece mucho tiempo en la planta. Forma poblaciones que cuando florecen son muy llamativas.

Altura promedio:

50 cm



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico




FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**




Chuscho de Monte



Familia

Solanaceae

Frecuencia




Especie

Nierembergia linariaefolia

Otros nombres Chucho, Matacaballo

Usos




ornamental

Herbácea perenne con hojas lineares y flores blancas con centro violáceo y amarillo. Forma pequeñas matitas, generalmente en pastizales y suelos arenosos. Menos común es una especie afín *Nierembergia rigida*, con flores totalmente blancas.

Altura promedio:

30 cm



flor **fruto**

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Cleome



Familia **Cleomaceae**

Frecuencia

Especie ***Tarenaya cordobensis***

Otros nombres


Usos

ornamental

Crece en el bosque serrano hasta los 2000 msnm. Flores con 4 petalos blancos dispuestos como pantalla detras de 6 estambres rojizos.

Altura promedio:

50 cm



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**




Cola de Quirquincho



Familia

Lycopodiaceae

Frecuencia




Especie

Phlegmariurus saurus

Otros nombres

Hierba del amor


Usos



medicinal

Hierba perenne presente en suelos rocosos en la parte alta de las sierras. Tallos erectos y cilíndricos, cubiertos de hojas lineal-lanceoladas de color verde amarillento, dispuestas en forma espiralada. Al pertenecer a un grupo taxonómico más cercano a los helechos, no presenta flores.

Altura promedio:

40 cm

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

El Pantanillo
Jardín Botánico

 **FTU**
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Coral del Campo



Familia

Acanthaceae

Frecuencia




Especie

Dicliptera squarrosa

Otros nombres

Canario rojo


Usos



ornamental

Crece en zonas sombrias. Flores con corola bilabiada rojo coral y 2 estambres ubicados debajo del labio superior.

Altura promedio:
50 cm



flor **fruto**

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**




Cortadera



Familia

Poaceae

Frecuencia




Especie

Cortaderia selloana

Otros nombres

Plumero de la Pampa

Usos



ornamental

Herbácea de gran porte, con hojas finas y largas con borde filoso. Sus inflorescencias son densas y plumosas, de color blanco, a veces rosado. Suele estar cerca de arroyos o humedales.

Altura promedio:

2,5 m



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**



Culandrillo



Familia

Pteridaceae

Frecuencia




Especie

Adiantum raddianum

Otros nombres Helecho culantrillo

Usos




medicinal / ornamental

Helecho que crece en lugares sombríos, cerca de cursos de agua. Tiene tallos negros que contrastan con el verde brillante de las hojas.

Altura promedio:

40 cm



JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico

 **FTU**
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Doradilla



Familia **Pteridaceae**

Frecuencia

Especie ***Anemia australis***


Otros nombres

Usos

medicinal / ornamental

Helecho terrestre que crece en lugares sombríos y en grietas de rocas. Se lo distingue por la presencia de una estructura en la base de las hojas que expone las partes fértiles (esporangios) de color pardo.

Altura promedio:
40 cm



JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**




Flor de la Oración



Familia

Onagraceae

Frecuencia




Especie

Oenothera affinis

Otros nombres Dondiego de noche


Usos



medicinal / ornamental

Herbácea presente en pastizales y cerca de arroyos. Hojas alargadas, brotes del tallo rojizos. Sus flores amarillas abren al atardecer y se marchitan con las primeras luces de la mañana.

Altura promedio:
50 cm



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico

 **FTU**
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Flor de la Vida



Family Apocynaceae

Freudiana


Otros nombres US

11. *What is the primary purpose of the following statement?*

medicinal / ornamental

sabanas. Flores pequeñas de color rojo oscuro y blanco, dispuestas en cabezuelas. Presenta látex.

50 cm



ENF EFB

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

BRUNSWICK COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION



El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU Facultad de Turismo y Urbanismo

GUIA DE CAMPO **NATIVAS**



Helecho de la Sierra



Familia **Pteridaceae**

Frecuencia

Especie ***Cheilanthes buchtienii***

Otros nombres


Usos

ornamental

Helecho más frecuente fuera de los cursos de agua. Frondes con el haz verde oscuro y el envés piloso, reviviscentes (se secan en invierno y reviven con las primeras lluvias)

Altura promedio:

30 cm



JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico

FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Hierba de la Víbora



Familia

Apocynaceae

Frecuencia





Especie

Asclepias mellodora

Otros nombres

Leche de la víbora


Usos



medicinal / ornamental

Mata erecta, hojas verde oscuro, flores en umbelas con pétalos blanco-verdosos volcados hacia abajo, dejando hacia arriba corona, estambres y gineceo.

Altura promedio:

40 cm

flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Huevito de Gallo



Familia

Solanaceae

Frecuencia




Especie

Salpichroa organifolia

Otros nombres Huvita de campo

Usos




medicinal / alimenticia

Crece en zonas sombrias con suelos modificados. Las flores son blancas, solitarias y péndulas, el fruto es una baya blanquecina comestible.

Altura promedio:

40 cm



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**



Coirón



Familia **Poaceae**

Frecuencia

Especie ***Jarava ichu***

Otros nombres **Paja**


Usos

ornamental

Gramínea perenne, muy habitual en pastizales y manchones abiertos del bosque. Presenta inflorescencias blanco sedosas.

Altura promedio:

80 cm



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**




Kitucho



Familia

Solanaceae

Frecuencia




Especie

Capsicum chacoense

Otros nombres

Ají del monte


Usos



medicinal / alimenticia / ornamental

En la sierra crece en el sotobosque de Molle de beber, aunque es de amplia distribución entre la sierra y el valle. Sus flores son pequeñas, blancas y amarillas. Sus frutos carnosos, cónicos, erectos, color rojo, muy picantes.

Altura promedio:
60 cm



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico




FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**



Liga Blanca



Familia **Loranthaceae**

Frecuencia

Especie ***Tripodanthus flagellaris***

Otros nombres


Usos

medicinal / ornamental

Herbácea perenne hemiparásita con hojas lanceoladas y flores blancas muy perfumadas, su aroma puede sentirse a muchos metros de distancia y recuerda a vainilla y coco. Forma matas bastante densas sobre ramas de espinillos (**Vachellia caven**).

Altura promedio:

1 m



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico




FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**




Liga Roja



Familia

Loranthaceae

Frecuencia




Especie

Ligaria cuneifolia

Otros ombres

Muérdago criollo


Usos



medicinal

Hemiparásita, crece sobre otros árboles. Hojas algo carnosas, flores tubulares de color rojo. Muy visitada por picaflores.

Altura promedio:



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**



Mastuerzo



Familia **Lamiaceae**

Frecuencia

Especie ***Hedeoma multiflora***


Otro nombre **Peperina de las lomas**

Usos

medicinal

Crece en suelos pedregosos y expuestos, formando ruedas de pequeñas matas difíciles de identificar a simple vista. Muy aromática.

Altura promedio:
15 cm



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico

 **FTU**
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**



Orquídea Blanca



Familia **Orchidaceae**

Frecuencia

Especie ***Cyclopogon elatus***

Otros nombres


Usos

ornamental

Pequeña orquídea terrestre, crece en lugares oscuros del sotobosque. Presenta hojas en roseta. Inflorescencia verde amarronada con flores blancas. Florece a finales del invierno.

Altura promedio:

20 cm



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)




El Pantanillo
Jardín Botánico

 **FTU**
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Orquídea Roja



Familia **Orchidaceae**

Frecuencia

Especie ***Sacoila lanceolata***

Otros nombres


Usos

ornamental

Muy visible durante su floración por el color coral de sus flores. Luego presenta hojas anchas y acintadas de color verde oscuro dispuestas en roseta, que emergen luego de la floración.

Altura promedio:

40 cm



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico

 **FTU**
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Orquídea Verde



Familia **Orchidaceae**

Frecuencia

Especie ***Pelexia bonaeriensis***

Otros nombres


Usos

ornamental

Orquídea terrestre de largas hojas con notable nervadura central blanca, dispuestas en roseta. Inflorescencia de color blanco verdoso. A diferencia de la Orquídea Roja, primero aparecen sus hojas y luego sus flores.

Altura promedio:

40 cm



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**




Palo de Leche



Familia

Apocynaceae

Frecuencia




Especie

Oxypetalum coccineum

Otros nombres Falsa verbena

Usos




medicinal / ornamental

Crece en zonas abiertas, con mucho sol. Es una hierba erecta que se destaca por el color rojo de sus flores. Los tallos tienen látex.

Altura promedio:

40 cm



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico

FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Petunia



Familia

Solanaceae

Frecuencia




Especie

Petunia axillaris

Otros nombres

Coroyuyo

Usos




ornamental

Hierba anual que crece en suelos sueltos con mucha exposición solar. Llaman la atención sus flores blancas, acampanadas, de unos 4 cm de largo.

Altura promedio:

50 cm



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**




Redondita del Agua



Familia

Apiaceae

Frecuencia




Especie

Hydrocotyle bonariensis

Otros nombres

Perejil del agua


Usos



medicinal

Hierba perenne. Crece en suelos muy húmedos y remansos de arroyos. Llama la atención por sus hojas redondas que forman un tapiz sobre el agua.

Altura promedio:

5 cm

flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Romerillo Blanco



Familia **Asteraceae**

Frecuencia

Especie ***Baccharis artemisioides***

Otros nombres


Usos

ornamental

Subarbusto perenne, muy ramoso y con hojas lineares, llamativa por su coloración gris plateado, frecuente en zonas de pastizal.

Altura promedio:

60 cm



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Sangre de Toro



Familia

Phytolaccaceae

Frecuencia





Especie

Rivina humilis

Otros nombres Fruta tinta, Coralito


Usos



ornamental / medicinal / tintóreo

Hierba habitual en lugares sombreados del sotobosque, llamativa por sus racimos de flores blancas y frutos de color rojo intenso.

Altura promedio:
50 cm



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico

 **FTU**
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Sanguinaria



Familia

Onagraceae

Frecuencia




Especie

Oenothera rosea

Otros nombres Amapola del campo

Usos




ornamental

Hierba habitual en suelos modificados, perenne, poco ramificada, con flores de 4 pétalos rosado-púrpura con estrías más oscuras.

Altura promedio:

30 cm



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Santa Lucía



Familia **Commelinaceae**

Frecuencia

Especie ***Commelina erecta***

Otros nombres


Usos

medicinal / ornamental

Hierba perenne con tallos rastreros, a veces erectos, con flores con dos pétalos azules y uno más pequeño blanquecino. Es conocida por su uso medicinal para tratar afecciones oculares

Altura promedio:

50 cm




flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico





FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Siempreviva



Familia

Amaranthaceae

Frecuencia




Especie

Gomphrena pulchella

Otros nombres Siempreviva del campo

Usos




ornamental / medicinal

Hierbas perennes, decumbentes, habituales en suelos modificados y a pleno sol, con llamativas flores rosadas dispuestas en cabezuelas globosas que persisten una vez secas.

Altura promedio:

50 cm



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**



Stevia



Familia **Asteraceae**

Frecuencia

Especie ***Stevia satureiifolia* var. *satureiifolia***

Otros nombres


Usos

ornamental

Hierba perenne que crece en suelos arenosos o pedregosos expuesta al sol. Sus hojas son angostas y las flores rosadas se agrupan en inflorescencias muy vistosas. No es la Stevia que se usa para endulzar.

Altura promedio:

50 cm



flor **fruto**

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)




El Pantanillo
Jardín Botánico

 **FTU**
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Suico



Familia

Asteraceae

Frecuencia



Especie

Tagetes minuta

Otros nombres Chinchilla

Usos




medicinal

Hierba anual, erecta, frecuente en suelos modificados y zonas abiertas de bosques. Tanto sus hojas compuestas como sus inflorescencias tubulares son muy aromáticas.

Altura promedio:

70 cm



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU

Facultad de

Turismo y

Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**




Topasaire



Familia

Asteraceae

Frecuencia




Especie

Gaillardia megapotamica

Otros nombres

Botón de oro


Usos



ornamental / medicinal / tintóreo

Hierbas frecuentes en suelos pobres y arenosos, con follaje fino e inflorescencias de color amarillo (capítulo), con centro más oscuro y globoso.

Altura promedio:
50 cm



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

El Pantanillo
Jardín Botánico




FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Vara de Oro



Familia

Asteraceae

Frecuencia




Especie

Solidago chilensis

Otros nombres Penacho amarillo


Usos



medicinal / ornamental

Herbácea perenne con tallos erectos que terminan en una inflorescencia piramidal de color amarillo oro. Se la encuentra en pastizales, bordes de caminos y campos.

Altura promedio:
150 cm



flor **fruto**

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Verbena Roja



Familia

Verbenaceae

Frecuencia




Especie

Glandularia peruviana

Otros nombres Margarita punzó


Usos



ornamental / medicinal

Hierba rastrera, frecuente en terrenos pedregosos, en bordes de caminos y suelos modificados. Sus inflorescencias son muy llamativas, con flores de 5 pétalos de color rojo carmín.

Altura promedio:
5 cm



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**



TREPADORAS




El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**




Brotal



Familia

Basellaceae

Frecuencia





Especie

Anredera cordifolia

Otros nombres Enredadera de papa


Usos



medicinal/ornamental/alimenticia

Enredadera perenne muy vigorosa, con hojas algo carnosas. Posee raíz tuberosa. Su parte aérea desaparece en invierno. Flores pequeñas, blancas en espigas, muy abundantes.

Altura promedio: **5 m**



florfruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)




El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Cabello de ángel



Familia

Ranunculaceae

Frecuencia





Especie

Clematis montevidensis

Otros nombres

Barba de viejo

Usos




medicinal/ornamental

Liana con tallos delgados, hojas compuestas, flores abundantes color amarillo tenue y fructificación muy llamativa, con estilos alargados, blancos y plomosos. Presenta ejemplares macho y ejemplares hembra, sólo estos últimos desarrollan frutos.

Altura promedio:

3 m



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico




FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Campanilla



Familia

Convolvulaceae

Frecuencia




Especie

Ipomoea purpurea

Otros nombres

Suspiro, Bejucos


Usos



ornamental

Trepadora anual, con tallos muy vigorosos, hojas acorazonadas y flores acampanadas de color rosa, violeta, celeste o blanco. La mayor floración se da hacia fines de verano y comienzos de otoño hasta las primeras heladas.

Altura promedio: **4 m**



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)




El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Campanilla Roja



Familia

Convolvulaceae

Frecuencia




Especie

Ipomoea rubriflora

Otros nombres

Batatilla

Usos




Ornamental

Trepadora anual con hojas acorazonadas y trilobadas, flores de 2 a 3 cm acampanadas de color rojo.

Altura promedio:

3 m



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)




El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Campanilla Rosa



Familia

Convolvulaceae

Frecuencia




Especie

Ipomoea hyeronimii

Otros nombres Mecho, Mensuaca

Usos



Ornamental

Planta con tallos volubles, decumbente, con hojas grandes, enteras, ovadas y pecíolos muy pubescentes. Flores acampanadas, rosa tenue con garganta oscura.

Altura promedio:



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico

 **FTU**
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Flor de Patito



Familia

Aristolochiaceae

Frecuencia





Especie

Aristolochia argentina

Otros nombres Charrúa


Usos



medicinal / ornamental

Enredadera con raíz perenne, hojas redondeadas y acorazonadas, con flores tubulares verdosas-amarillas con nerviación púrpura. De costado tiene forma de patito.

Altura promedio:



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)




El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Globito



Familia

Sapindaceae

Frecuencia





Especie

Cardiospermum halicacabum

Otros nombres

Farolito japonés

Usos



medicinal / ornamental

Enredadera anual, con hojas trifoliadas y flores muy pequeñas de color blanco. El fruto es una cápsula globosa, péndula, de unos 3 cm de diámetro, verde con nerviación rojiza, que tiene en su interior 3 semillas negras con una mancha blanca en forma de corazón.

Altura promedio:



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)




El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS

TREPADORAS




Jazmín Chileno



Familia

Apocynaceae

Frecuencia




Especie

Mandevilla laxa

Otros nombres Jazmín del campo

Usos




Ornamental

Trepadora con tallo voluble, vigorosa, con hojas enteras, oblongas, brillantes. Presenta inflorescencias con flores blancas en forma de embudo, con 5 lóbulos. El fruto es un folículo alargado.

Altura promedio:

3 m



flor

fruto

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS



Mandevilla



Familia **Apocynaceae**

Frecuencia

Especie ***Mandevilla pentladiana***


Otros nombres **Mandevilla hoja grande**

Usos
medicinal / ornamental

Trepadora con tallo voluble pubescente, hojas grandes, flores blanquecinas dispuestas en racimos erguidos.

Altura promedio:

3 m



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**




Mariposa



Familia

Malpighiaceae

Frecuencia





Especie

Janusia guaranitica

Otros nombres

Mariposa del campo

Usos



medicinal / ornamental

Enredadera con hojas enteras, opuestas, oblongas, con inflorescencias de hasta 4 flores con 5 pétalos amarillos, muy llamativas. Se la encuentra en sotobosques sombreados.

Altura promedio:



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**




Pasionaria



Familia

Passifloraceae

Frecuencia





Especie

Passiflora caerulea

Otros nombres Flor de la pasión


Usos



medicinal / ornamental / comestible

Liana que trepa en árboles pequeños, arbustos y cercos con ayuda de zarcillos axilares. Tiene hojas palmadas, flores solitarias de hasta 10 cm de diámetro, muy llamativas, y frutos de hasta 7 cm color anaranjado.

Altura promedio:



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS




Peine de Mono



Familia

Bignoniaceae

Frecuencia



Especie

Amphilophium carolinae

Otros nombres Sacha esponja, Cepillo

Usos




Ornamental

Liana perenne, con tallos grisáceos y hexagonales, hojas trifoliadas, zarcillos foliares y flores acampanadas, blancas con la garganta amarillenta. Fruto: cápsula oblonga muy áspera.

Altura promedio:

3 m



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)




El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

**GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS**



Sombrilla



Familia

Apocynaceae

Frecuencia




Especie

Philibertia gilliesii

Otros nombres

Farolito

Usos



Ornamental

Enredadera perenne, voluble, con látex. Hojas acorazonadas. Flores con 5 pétalos soldados, con forma de paraguas, blanco verdosas por fuera y manchas rojas en la cara interna.

Altura promedio:



flor fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo
Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS

TREPADORAS



Tasi



Familia

Apocynaceae

Frecuencia




Especie

Araujia brachystephana

Otros nombres Doca


Usos



Comestible / medicinal

Enredadera con tallo voluble, con presencia de látex. Hojas triangulares con el ápice agudo. Flores pequeñas, poco llamativas, blanco verdosas. Fruto de 6-7 cm, rugoso (como un cerebro).

Altura promedio:



flor

fruto

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



El Pantanillo

Jardín Botánico



FTU
Facultad de
Turismo y
Urbanismo

GUÍA DE
CAMPO
NATIVAS

SOBRE ESTA GUÍA

Esta guía fue pensada como herramienta para la identificación a campo de las especies de plantas nativas más frecuentes de la ladera oeste de la Sierra de Comechingones, dentro de la ecorregión del Chaco Serrano. Los textos que acompañan las imágenes de cada especie, hacen hincapié en las características morfológicas que ayudan a su reconocimiento. Aquí está representada una parte de toda la biodiversidad vegetal de la región, pero aspiramos a que sea el punto de partida para profundizar en el conocimiento de la flora nativa por parte de la Comunidad y que se apropie de ellas, para incorporarlas a su identidad territorial...

QUIENES HICIMOS ESTA GUÍA



Cecilia Genovese

Téc. Univ. en Turismo (UNPSJB), Téc Univ. en Parques Jardines y Floricultura (UNSL), docente investigadora en el Área de Botánica y Educación Ambiental de la FTU-UNSL, incansable Guía y Educadora Ambiental, aunque bastante Botánica también.



Melina Costa

Arquitecta (UBA), Téc Univ. en Parques Jardines y Floricultura (UNSL), docente investigadora en el Área de Diseño de Parques y Jardines de la FTU-UNSL. Apasionada paisajista y directora de orquesta de flores silvestres.



Alejandro Suyama

Lic. Cs. Biológicas (UBA), Mg. en Producción Agropecuaria en Regiones Semiáridas (UNLPam), Docente Investigador en la FTU-UNSL en el área de Botánica Morfológica y Sistemática Vegetal. Autopercebido botánico a secas y amante incondicional de las plantas nativas.

[Volver al inicio](#)